

Barth - ESOP

Arkusz oceny dla skuteczności maści z Urydyną do leczenia Hand-foot syndrome wywołanego przez 5-Fluorouracil (5- FU) we wlewie lub jego doustne pochodne Capecitabina(C) , Uracyl/ Tegafur(UFT).

Pacjent (Inicjały+ wiek)	Płeć		Powodujący Czynnik (5-FU/C/UFT)	Stopień toksyczności (CTC) ¹	Czas leczenia -FU/C/UFT (łącznie dawka)	Dotknięte (H,F,H+F? ²)	Czas trwania lecz./tygodni/ do wyraźnego początku ulgi	Leczenie Szpitalne (I) ambulatoryjne (O)	Częstotliwość użycia w ciągu dnia (min. q3d)
	Mężczyzna (M)	Kobieta (K)							

¹ CTC wersja 2, poprawione 4/30/99; niepożądane zdarzenie → dermatologiczne/skóra → Hand –foot reakcja skórna

Stopień

- 0- żadne
- 1- zmiany skórne lub zap. bez bólu (np. rumień, łuszczenie skóry)
- 2- zmiany skórne z bólem nie zaburzające normalnej aktywności
- 3- zmiany skórne z bólem ,zaburzające normalną aktywność
- 4- niezdefiniowane

² H=ręka ,F=stopa, H+F=obie